



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®



POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Pomme de Terre

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 20 du 27 août 2002 - 01 page

Phénologie

Stade : Grossissement des tubercules à sénescence du feuillage. Le défanage se poursuit sur les variétés de consommation. Les arrachages ont débuté.

Mildiou

Le coin des modèles

Les orages de la semaine dernière ont relancé la maladie sur tous les postes. Les modèles nous indiquent de nouvelles sorties de taches dès ce début de semaine.
Sur la plupart des postes, selon Milsol, les indices de sporulation sont forts,et moyens pour le sud de la région .

Prévisions climatiques

En ce début de semaine, le temps restera maussade et parfois pluvieux, selon Météo France. On observera une alternance de périodes ensoleillées et de passages nuageux à partir de jeudi, et le temps devrait rester sec jusqu'au week-end.

Appui à l'interprétation du modèle

Le potentiel de sporulation reste élevé. Par conséquent, **il convient de maintenir une protection soignée.**

Préconisations pour les parcelles que l'on veut maintenir en végétation

TOUTES VARIETES

▸ ***Poursuivez un renouvellement à 7 jours avec un dithiocarbamate à 1600 g de m.a.***

Préconisations pour les parcelles où la date de défanage est proche


TOUTES VARIETES

▸ ***Dans le cas où des symptômes de mildiou ont été observés, préférez l'emploi des produits type fluazinam (SHIRLAN) ou cyazofamide (RANMAN). Ces produits permettent de minimiser les attaques de mildiou sur tubercules. Un renouvellement à 7 jours est conseillé.***

▸ ***Dans le cas contraire, maintenez une protection avec un mancozèbe.***

▸ ***Pour les parcelles où le défanage est en cours, maintenez une protection fongicide jusqu'à dessiccation totale des fanes.***

A l'occasion de ces dernières applications de fongicides, soyez attentif au Délai Avant Récolté (DAR). Cf tableau de synthèse de la Note Commune 2002.



Mildiou

Le potentiel de spore reste élevé.

Situation épidémiologique poste par poste

(d'après Guntz-Divoux)

Postes climatiques	Génération	Date dernières Contaminations	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens (Boves)	12ème	19-21, 25/8	25-27/8, 1/9	fort
Attilly	13 ème	19-21, 24/8	26-28, 31/8	fort
Ebouleau	13 ème	20, 21, 23, 24/8	26 au 30/8	fort
Forté	13 ème	19 au 25/8	26/8 au 1/9	fort
Froidmont	13 ème	20, 21, 23, 24/8	26 au 30/8	fort
Inval	13 ème	19 au 25/8	26/8 au 1/9	fort
Marcelcave	14 ème	19-21, 24/8	26-28, 31/8	fort
St Just	11 ème	19-21/8	26-28/8	fort
Vauvillers	15 ème	19-21, 24/8	26-28, 31/8	fort
Verdilly	11 ème	20 au 24/8	27 au 31/8	moyen
Vic sur Aisne	10 ème	19-21/8	25 au 27/8	moyen
Villiers le Sec	12 ème	19-21/8	25 au 27/8	moyen
Villers Bocage	14 ème	19-21/8	26 au 28/8	fort

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue
318, rue St Fuscien
BP 69
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
E-mail : srpv.draf-picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-picardie.com

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant : Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°1823AD
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 55 €
Tarif Fax 55 €
Tarif E-mail 55 €